



A landscape featuring colorful volcanic rock formations in shades of red, orange, and yellow. Several geysers are erupting, sending plumes of white steam or water into a clear blue sky. The foreground is a flat, rocky area with some sparse vegetation.

COMORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE ABUSADOR/ADICTO

Dr. Miguel Sabogal, MD.

COMORBILIDAD



COMORBILIDAD

- Es una parte dentro de los factores de riesgo para abuso de sustancias
- Se reconoce que es difícil de identificar y de tratar



**La comorbilidad médica es frecuente:
HIV, Hepatitis C, Tuberculosis,
Enfermedades de transmisión sexual,
cáncer, enf. Cardiacas, hipertensión,
traumas, accidentes.**



<http://www.acsam.com.co>
Dr. Miguel Sabogal, MD.



COMORBILIDAD

- ❑ Hay muchas relaciones entre uso de sustancias y psicopatología
- ❑ La psicopatología precede al uso de sustancias
- ❑ Se desarrolla como consecuencia del uso de sustancias
- ❑ Aumenta su severidad por el uso de sustancias
- ❑ Aumenta la vulnerabilidad del individuo



<http://www.acsam.com.co>

- **La comorbilidad es muy importante estudiarla.**
- **Se asocia a fracaso a corto y largo plazo en el tto, a aumento en el numero de hospitalizaciones, a incremento en la posibilidad de suicidio.**



TRATAMIENTO

- El tratamiento general seria el mismo:
- Detoxificacion y luego estrategias biopsicosociales para mantener la abstinencia.



TRATAMIENTO

- Siempre el tratamiento es mejor que el no tratamiento, aunque los efectos del mismo no sean uniformes.
- La psicopatología asociada, en especial el desorden de conducta, se correlaciona negativamente con poder adherirse y terminar un tratamiento, y con la abstinencia posterior.
- Otros autores dicen que la comorbilidad psiquiátrica sería la "primera razón" (**AUTOMEDICACIÓN**), para que un adolescente use sustancias.



<http://www.acsam.com.co>

COMORBILIDAD

- **Desorden de conducta 50-80%**
- **Depresión 20-50%**
- **ADHD**
- **Suicidio**
- **Ansiedad 8-40%**
- **Bulimia Nerviosa**
- **Juego Patológico**
- **Esquizofrenia**



COMORBILIDAD

- En población general con abuso de alcohol y drogas:
 - 50% tenían comorbilidad
 - 28% desorden de ansiedad
 - 26% desorden del afecto
 - 18% T. De personalidad antisocial
 - 7% Esquizofrenia

COMORBILIDAD

- **En adolescentes hospitalizados por alcohol y abuso de drogas:**
 - **61% Desordenes del afecto**
 - **54% Desordenes de conducta**
 - **43% desordenes de ansiedad**



DEPRESIÓN

- ◆ Los adolescentes reportan mucho la irritabilidad.
- ◆ En abusadores 22 a 30% tienen depresión, de esta **más de la mitad es secundaria al abuso de sustancias**. Se dice que solo el 8% sería primaria.
- ◆ Interfiere en el tío, alterando en gran medida la concentración y la motivación
- ◆ Si se trata o no, requiere evaluación "caso por caso".



ADHD

- ◆ Es un problema relacionado con otros trastornos: desorden de conducta, ansiedad, T. Antisocial, abuso de sustancias.
- ◆ Se debe tratar con medidas conductuales y farmacológicas.
- ◆ Se relaciona bastante con búsqueda de automedicación (marihuana y cocaína)



T. CONDUCTA Y PERSONALIDAD ANTISOCIAL

- ◆ Particularmente en hombres puede ser el Dx de comorbilidad más asociado al abuso de sustancias.
- ◆ Estos adolescentes necesitan un programa muy claro y fuerte en los límites y las normas.
- ◆ Muy difícil el tratamiento sin un programa.



<http://www.acsam.com.co>

© *Ricardo Polini*
www.fondadescrittorio.com

ESQUIZOFRENIA

- ◆ Son pacientes que generalmente ingresan a tto a la Unidad Psiquiátrica o a Unidad de cuidado Intensivo psiquiátrico.
- ◆ Lo mejor es colocarlos en un programa de adicciones que maneje paralelamente su psicosis.

T. ANSIEDAD

- ◆ **Trast. Estrés Postraumatico**
- ◆ **Trast. Obsesivo- Compulsivo**
- ◆ **Trast. Ansiedad Generalizada**
- ◆ **Fobia Social**

ESTRÉS

- ◆ Todos sin excepción
- ◆ Es acumulativo
- ◆ Se requiere energía adicional
- ◆ Afecta diferentes áreas
- ◆ Necesita válvulas de escape



GRACIAS

<http://www.acsam.com.co>

